



INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS EN PLAYA ARIO, COSTA RICA

ÁREA DE CONSERVACIÓN TEMPISQUE

Investigador Principal
Greivin Fallas Bonilla, MSc.

Co-Investigadores

Keylin Torres Peraza

Leonardo Esquivel Pérez

Ashley Grew Paul
Leydis Yaret Torres Ferrufino

Asociación CIRENAS Bongo Arío

Permiso de Investigación: 29/06/2020 – 30/03/2021

Contenido

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES	3
OBJETIVOS	4
DURACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	4
MATERIALES Y MÉTODOS.....	5
RESULTADOS	19
INFORME DE COLECTA CIENTIFICA.....	19
INFORME DE INVESTIGACION CIENTIFICA.....	20
Área física disponible como sitio de anidamiento	20
Número de hembras anidadoras	20
Número de nidos por especie.....	20
Porcentaje de eclosión de las nidadas en playa	21
Temperatura de incubación para el anidamiento.....	23
Recomendaciones de manejo	23
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS	24
CONCLUSIÓN.....	25
BIBLIOGRAFÍA.....	26
ANEXOS	27

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El siguiente informe presenta los resultados de las actividades de la temporada de anidación en playa Ario, ubicada en la Península de Nicoya de Costa Rica, junto a la desembocadura del río Bongo y perteneciente al RNVS Caletas-Ario, con datos colectados tanto de anidación como de eclosión de las nidadas durante la temporada 2020-2021, que comprendió los meses de anidación de junio a febrero, finalizando en febrero del 2021, mes de las últimas eclosiones de neonatos de nidos sembrados en el vivero experimental. Esta labor fue realizada por el equipo de investigación de la Asociación CIRENAS.

Como parte de la metodología se diseñó para recolectar información sobre: área física disponible como sitio de anidamiento, número de hembras anidadoras, número de nidos por especie, porcentaje de eclosión de nidadas en playa y temperatura de incubación para el anidamiento. Así como, evidencia de la problemática en la playa que dificulta las labores de protección y conservación.

Para esta temporada se presentó la emergencia sanitaria por COVID-19, lo cual vino a repercutir en una menor vigilancia en playa y además en poca colaboración por parte de voluntarios tanto nacionales como extranjeros, lo que hizo que se realizarán menos patrullajes en playa y por ende se recolectó menos información de la anidada de tortugas marinas, que es normal en la temporada, por lo tanto en este informe no se realiza una comparación con otras temporadas, dado que es alto el sesgo en los datos recopilados.

El monitoreo para esta temporada permitió el avistamiento de 42 tortugas que anidaron satisfactoriamente y cuyos huevos fueron trasladados al tortugario para un total de 3752 huevos, que al final fueron liberados al mar 2378 neonatos, para una efectividad del 64% de eclosión de los huevos.

La especie predominante en la playa es la tortuga *Lepidochelys olivacea* (Lora) siendo el principal objeto de conservación (OdC) que anida en esta playa Ario

OBJETIVOS

Conservar e investigar las poblaciones de tortugas marinas que anidan en playa Arío mediante métodos de manejo y educación ambiental.

Entre los objetivos específicos están:

- Educar a las comunidades cercanas con programas de educación ambiental e integración en el proyecto.
- Programar campañas de limpieza de playa, rotulación y preparación del vivero con ayuda de miembros de la comunidad y voluntariado.
- Coordinar monitoreos, conteo e identificación de las especies, valorar su estado y plan de manejo.
- Evaluar la temperatura de incubación de los nidos.
- Reubicar los nidos según el criterio de manejo y dar seguimiento hasta la eclosión y arribada al mar de los neonatos.
- Analizar los datos recolectados y presentar informes al SINAC y a la Junta Directiva de CIRENAS.

DURACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

La duración del proyecto de investigación, así como la recolección de datos se dio a partir del día primero de junio del año 2020, hasta el día veintiocho de febrero del 2021, bajo la resolución N° ACT-OR-DR-051-20.

MATERIALES Y MÉTODOS

El área de estudio correspondiente a la zona de playa, se ubica cercana a la comunidad de Manzanillo, Cobano Puntarenas, en el litoral del Pacífico sur de la Península de Nicoya, playa Ario limita en la desembocadura del río Bongo a $9^{\circ} 72' 18.47''$ Norte y $85^{\circ} 22' 05.35''$ Oeste. Es una playa extensa y arenosa con partes rocosas, el tamaño de la playa a monitorear es de alrededor 3,5 kilómetros, los puntos límites del trayecto serán la punta rocosa del hotel Frangi Pani a la Desembocadura del Rio Bongo (Figura 1).




Figura 1: Ubicación de playa Ario (Mapa elaborado por Greivin Fallas, utilizando Google Maps).

La ubicación del vivero para los nidos de tortugas marinas está localizado en la parte central con acceso a camino hacia la estación del Refugio para facilitar el acceso y vigilancia al mismo (figura 3).




Figura 2: Vivero de tortugas marinas de playa Ario, para la temporada 2020-2021.



Figura 3: Imagen topográfica que muestra el punto de ubicación del vivero de tortugas marinas en la playa Ario.

La metodología a emplear está basada en el cumplimiento de cinco indicadores, los cuales se describen en el siguiente diseño lógico y posteriormente se explica cada indicador con detalle.



Para cada indicador se empleará una metodología específica, la cual se detalla a continuación:

Área Física Disponible como sitio de Anidamiento


Objeto de conservación: Playa de anidación de tortuga marina	
Categoría: Tamaño	
Indicadores a medir: Área física disponible como sitio de anidamiento	
Metodología	<p>El tamaño de playa a monitorear en playa Ario tiene una extensión de 3,5 km. La playa se dividió en mojones instalados cada 50 metros a lo largo de la playa, los cuales sirvieron de punto de referencia para describir el área física de la playa como sitio de anidamiento. La zona vertical de la playa como sitio de anidamiento se analizó por tres zonas de puesta – la berma con vegetación, el borde o la berma arenosa, y la zona abierta – y solo se registró si la tortuga logro anidar. Las tortugas marinas se registraron según su avistamiento y su ubicación en la playa por mojón (Figura 4).</p> <p>En el área física disponible, también se ubicó el vivero experimental, el cual estuvo ubicado en un punto estratégico para facilitar el transporte de los huevos recolectados en playa lo más pronto posible y colocarlos en el nido.</p> <p>Se utilizaron las siguientes herramientas y equipo: Luz infrarroja, ropa oscura o camuflada, hojas de campo, lápices y tajador.</p> <p>Los datos que se registraron son:</p> <ul style="list-style-type: none">• Marea – donde se encuentra la marea – alta, medio subiendo, baja, o medio bajando.• Horas: es la hora en que se encuentra la actividad de tortuga marina.<ul style="list-style-type: none">○ Encuentro: es la hora en que se encuentra la actividad, sin importar el estado en que se encontró el mismo.• Hora – de encontrar de la tortuga.• Mojón – sector demarcado de la playa donde se encuentra avistamiento de tortuga marina.• Zona de Puesta: corresponde a la zona vertical de la playa donde la tortuga deposita los huevos.<ul style="list-style-type: none">○ Veg: la zona con vegetación, es decir la zona plana del límite de la playa donde se encuentran plantas y arbustos.○ Berma: la zona arenosa, es decir a la planicie que está inmediatamente después del límite con la vegetación y hasta 5 metros hacia el último punto de la marea alta.○ Abierta: la zona inter mareal a partir del límite con el borde y hasta el mar.

Verificadores	Mojones marcados en el sector de la playa. Mapa de la zona de avistamientos por mojones. Hoja de campo. (Anexo 1)
Rango de Variación permisible	Según el área total de la playa de anidación se estima la efectividad del área disponible con la siguiente escala: 10% de área disponible = muy bajo 30% de área disponible = bajo 60% de área disponible = medio 80% de área disponible = bueno 100 % de área disponible = muy bueno

Número de Hembras Anidadoras

Objeto de conservación: Playa de anidación de tortuga marina	
Categoría: Tamaño	
Indicadores a medir: Número de hembras anidadoras	
Metodología	<p>Para determinar el número de hembras que anidan en el sector demarcado para playa Montezuma, se planificaron recorridos nocturnos en la playa, los cuales estuvieron comprendidos entre 18 horas a las 05 horas del día siguiente.</p> <p>Para llevar a cabo el registro de las hembras que anidan en playa se siguió el siguiente procedimiento:</p> <p>Por medio de dos posibles tipos de señales de actividad de tortugas marinas, negativas y positivas. Las negativas consisten en el hallazgo de un rastro de tortuga, pero sin que se encuentre el espécimen, se debe registrar en la hoja de campo (Anexo 1) y tratar de encontrar los huevos, de no ser así se anotó todo lo concerniente a la actividad, dejando en blanco los espacios que no aplica. En caso que encontraron los huevos, se harán las anotaciones del caso en el formulario de campo y si existe algún peligro asociado, deben ser sacados de la arena, y con extremo cuidado y se trasladaron al vivero, previa anotación de todos los datos en la hoja de campo.</p> <p>En las señales positivas, que es cuando se encuentra físicamente a la tortuga desovando en playa o ingresando a la playa a desovar, es decir, en el proceso de pre o pos ovoposición, en este caso se hace la anotación en la hoja de campo.</p>

	<p>En las señales positivas, se llevó a cabo el marcaje de la tortuga, cuando este sea posible, que se da durante el proceso de ovoposición; antes de realizarlo, se revisará si la tortuga tiene alguna evidencia de marcas viejas, luego se debe llevar a cabo la limpieza de la segunda escama de cada aleta delantera, donde se colocarán las marcas (Balazs, 1982). El marcaje se realizará separadamente en cada aleta, y la anotación, igualmente debe estar separada, para lo que corresponda a la aleta izquierda, y a la aleta derecha. La marca con la denominación menor debe ser colocada en la aleta izquierda y la marca con la denominación mayor en la aleta derecha.</p> <p>Para realizar esta labor se registraron los siguientes aspectos en la hoja de campo propuesta por CIERNAS:</p> <ul style="list-style-type: none">● Horas: es la hora en que se encontraron la actividad de tortuga marina.<ul style="list-style-type: none">○ Encuentro: es la hora en que se encontraron la actividad, sin importar el estado en que se encuentre el mismo.○ In Puesta: es la hora de inicio de puesta, cuando la tortuga inicia a ovopositar (este dato puede que no se anote debido a que al momento de encontrar la actividad la tortuga ha iniciado el proceso de ovoposición).○ Fin Puesta: en este se anota la hora en que la tortuga finaliza el proceso de ovoposición. (este dato puede que no se anote debido a que al momento de encontrar la actividad la tortuga ya concluyó el proceso de ovoposición.)● Etapa: corresponde la actividad que estuvo realizando la tortuga en el momento en que se la encontró Se registra según el número de etapa del proceso que le corresponde (como descrito abajo.)● Especie: si se pudo identificar, si no se indica como no indicado – N/I● Anidó: corresponde al hallazgo de una nidada. Se indica como Sí, No, o N/S● Datos biométricos: se registra los datos biométricos de la tortuga de la siguiente manera según la UICN (2000):<ul style="list-style-type: none">○ Ancho del caparazón (ACC): midiendo el punto más amplio del caparazón del costado izquierdo al costado derecho del plano sagital, utilizando una cinta métrica flexible.○ Medidas del largo curvo del caparazón nugal-supracaudal (LCC): medida que va desde el punto medio anterior (escudo nugal) al extremo posterior de los escudos supracaudales.
--	--

	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: right;">Fuente: Chacón, 2007</p> <p>Figura 5: Datos biométricos de la tortuga marina. (A) Largo Curvo de caparazón. (B) Ancho Curvo Caparazón.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marcaje: corresponde a los detalles del marcaje, que se anotan por cada aleta separadamente. Para cada una de los siguientes datos que se registran (las siguientes viñetas,) se anota dos veces, una vez para cada la aleta izquierda, y otro para la aleta derecha. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si: corresponde a la presencia de una marca que fue colocada en un evento anterior. ▪ No: corresponde a la ausencia de marca. ▪ #__: corresponde al espacio en el que se debe anotar el número de la placa, sea que ya la porte o que se le aplique en ese momento. ▪ Cicatriz: corresponde a si la tortuga tiene una cicatriz potencialmente causada por una marca. ▪ Desgarre: corresponde a una cicatriz que deja la laca cuando se engancha de algo y al tirar la tortuga desgarra la piel. ▪ Hueco: corresponde a una cicatriz que al ser mal colocada esta se abre dejando un hueco en la zona donde estuvo colocada. ▪ No presenta: corresponde a la no presencia de cicatriz. <p>El equipo utilizado para dichos recorridos es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizando luz infrarroja • ropa oscura o camuflada • Mochila de campo (con formularios, guantes, bolsas, lápiz) • equipo de marcación de tortugas.
Verificadores	<p>Número de marcas colocadas. Avistamientos registrados como positivos y negativos.</p>

Rango de Variación permisible	<p>Se usará un promedio de hembras anidadoras en el área disponible, se debe tener como mínimo el registro de dos temporadas para hacer una valoración en porcentajes.</p> <p>Por lo que la escala a utilizar para el indicador es la siguiente:</p> <p>Muy malo = 0-20% Malo = 21-49% Medio = 50-60% Bueno = 61-74% Muy bueno = 75-100%</p>
--------------------------------------	--

Número de Nidos por Especie

Objeto de conservación: Playa de anidación de tortuga marina	
Categoría: Tamaño	
Indicadores a medir: Número de nidos por especie	
Metodología	<p>Se hizo la reubicación de nidos al vivero en los casos en que se encuentren en peligro de ser depredados, destruidos, compactados, robados u otras acciones o condiciones que se consideren inseguras para el nido.</p> <p>Para determinar el número de nidos por temporada, se utilizó un vivero experimental de tipo cerrado, el cual estará ubicado en el área disponible detallada anteriormente.</p> <p>El procedimiento se hizo de la siguiente manera:</p> <p>Al encontrar el nido de tortuga que esta ovopositando se recogen los huevos para ser trasladados al vivero lo más pronto posible. Para trasladar los huevos se emplearán bolsas de plástico oxobiodegradable, en el vivero se hará el nido similar al que hace la tortuga dependiendo de la especie, se contarán los huevos y posterior se cierra el nido y hacer las anotaciones en la hoja de campo (Anexo 1).</p> <p>En caso que el nido no pueda ser trasladado el vivero se hará una reubicación <i>in situ</i>, se contarán y se reubicarán por medio de triangulación en un sector de la playa seguro. Estos nidos de igual manera se les hará un monitoreo para poder registrar su eclosión y posterior exhumación para tener el detalle de la cantidad de huevos eclosionados.</p> <p>Se utilizarán los siguientes herramientas y equipo:</p>

	<p>Bolsas plásticas vírgenes, guantes de látex</p> <p>Los registros que se registrarán son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Destino: corresponde a la ubicación del nido. <ul style="list-style-type: none"> ○ V: corresponde a las nidadas que van al Vivero ○ R: corresponde a las nidadas que se Relocalizan en playa. ○ N: corresponde a los nidos que se dejan en el lugar donde los depositó la tortuga, es decir al Natural. • Total de Huevos: corresponde a la cantidad total de los huevos depositados por la tortuga. En caso de que un huevo se rompa, incluirlo en el total de huevos, y anotar la observación en la parte destinada para observaciones en la ficha de campo. • Hora de Siembra: en esta casilla se anota la hora en que los huevos son relocalizados en un sitio del vivero o en otro diferente al que la tortuga los dejó inicialmente. (este dato puede que no se anote debido la actividad no genere ovoposición, o que esta no sea encontrada.)
Verificadores	<p>Hoja de campo para el recorrido en playa. Gráficas de tendencia de la temporada.</p>
Rango de Variación permisible	<p>Se usó un promedio de hembras anidadoras en el área de anidamiento escogida, se debe tener como mínimo el registro de dos temporadas para hacer una valoración en porcentajes.</p> <p>Por lo que la escala a utilizar para el indicador es la siguiente:</p> <p>Muy malo = 0-20% Malo = 21-49% Medio = 50-60% Bueno = 61-74% Muy bueno = 75-100%</p>

Porcentaje de Eclosión de Nidadas en Playa

Objeto de conservación: Playa de anidación de tortuga marina	
Categoría: Tamaño	
Indicadores a medir: Porcentaje de eclosión de nidadas en playa	
Metodología	<p>Para determinar el porcentaje de eclosión, se empleó la técnica del vivero experimental, ya que se obtiene un mayor control y vigilancia de los nidos.</p> <p>Para asegurarnos el éxito de la eclosión de los neonatos se empleó el siguiente procedimiento:</p> <ul style="list-style-type: none">• Luego del traslado de los huevos, se debe hacer la cámara de incubación para la nidada correspondiente en el vivero. Esta cámara debe de tener una profundidad estándar de 45 cm para tortuga Lora, de 70 cm para Baula, 55 cm para tortuga Verde o Carey. El ancho de la recamara debe ser suficiente para que los huevos queden dentro de la misma. El ancho de la boca de la cámara de incubación debe ser el menor posible, para evitar contaminación en los huevos.• Luego de terminar la construcción de la cámara de incubación se procederá a colocar los huevos de la nidada en la parte interna de la cámara, la colocación de cada huevo se debe hacer de forma individual, contabilizado y anotado en la hoja de campo.• Por último se cierra la cámara de incubación y se coloca en la parte superior una canasta con malla mosquitero, la cual se sujeta con cinta topográfica en la que se anotará el código de nido, cantidad de huevos incubados, la fecha de siembra, la fecha de remoción de la arena (36 días) y la fecha posible de nacimiento (45 días). <p>Cuando el nido eclosiona, los neonatos se colocarán en una tina o balde de plástico que será utilizado exclusivamente para este propósito. En el fondo de esta tina se colocará una capa de arena húmeda y en caso de que los neonatos nazcan en horas de sol, esta deberá taparse con una tela oscura en la parte superior para evitar la entrada de luz y esperar hasta que baje el sol y ser liberadas. En este proceso siempre se utilizará luz roja.</p> <p>Cuando se van colocando en la canasta para la liberación se deben contar y se anotar en la hoja de campo los datos requeridos. También se tomará nota de la especie en caso</p>

	<p>que no se pudo identificar en el momento de encontrar el nido.</p> <p>Para llevar a cabo la fertilidad de las nidadas, se lleva a cabo por medio del proceso de exhumación en nidos del vivero, el cual consiste en abrir el nido tres días después de la primera emergencia de neonatos. El objetivo es evaluar la cantidad de huevos que eclosionaron y los que no lo hicieron, además de determinar si quedaron neonatos vivos que no pudieron emerger.</p> <p>El Procedimiento de exhumación se realizó de la siguiente manera:</p> <p>Se abre el nido y con cuidado se va sacando la arena, una vez que se localicen cascaras de huevo, huevos enteros y neonatos vivos o muertos se van contando la cantidad de cada uno.</p> <p>Se utilizarán los siguientes herramientas y equipo: Guantes de látex, marcador permanente, cinta topográfica, canastas redondas de cedazo, malla mosquitero, baldes plásticos.</p> <p>Los registros que se registrarán son:</p> <ul style="list-style-type: none">• Número de Nido: corresponde al número de nido en la temporada, este número es asignado en la mañana siguiente, cuando se escriben las bitácoras.• Código: corresponde al código alfa numérico que se asigna al cuadrante del vivero donde es depositado el nido. Se debe anotar en el momento en que se deposita el nido en el vivero.• Responsable del vivero: corresponde a la persona quien estuvo en cargo del vivero y de la siembra del nido.• Datos de Vivero: corresponde a los datos de eclosión del nido.<ul style="list-style-type: none">○ 1°, 2°, y 3° Emergencias: corresponde a los detalles del primera, segunda, y tercera emergencia de neonatos de la nidada. Si todos emergen juntos en la primera emergencia, o en los primeros dos, se dejan las otras emergencias en blanco. Si faltan emerger neonatos después del tercer emergencia, se anota esos datos en la casilla de observaciones. Para cada emergencia, se registran los siguientes datos.<ul style="list-style-type: none">▪ Responsable: corresponde a la persona encargada de cuidar el vivero y que hizo el registro de los datos▪ Fecha y Hora de la primera emergencia
--	---

	<ul style="list-style-type: none">▪ # Vivos: corresponde al número de neonatos que lograron salir del nido que se encuentran vivos.▪ # Muertos: corresponde al número de neonatos que lograron a salir del nido pero fallecieron antes de su liberación.• Exhumación: corresponde a los datos de la exhumación del nido.<ul style="list-style-type: none">○ Responsable: corresponde a la persona quien estuvo en cargo de la exhumación.○ Fecha: es la fecha en que se sacó todo el material biológico del nido.○ Hora: la hora en que se saca todo el material biológico del nido.• Neonatos Emergiendo vivo: son todos los neonatos que se encuentran entre la recamara y la boca del nido a la hora de la exhumación y que aún están vivos.• Neonatos Emergiendo muerto: son todos los neonatos que se encuentran entre la recamara y la boca del nido a la hora de la exhumación y que perecieron en el proceso.• Neonatos dentro del nido vivo: son todos los neonatos que se encuentran en la cámara del nido a la hora de la exhumación y que aún están vivos.• Neonatos dentro del nido muerto: neonatos que se encuentran en la cámara del nido a la hora de la exhumación y que perecieron.• Especie: corresponde a la tortuga que se está trabajando, esta puede ser, L.o. que se refiere a <i>Lepidochelys olivacea</i>, C.m. <i>Chelonia mydas</i>, E.i. <i>Eretmochelys imbricata</i>, y D.c. <i>Demochelys coriacea</i>.• Días de incubación: Rango de días comprendidos entre la fecha de siembra y la fecha de la primera emergencia.• Huevos depredados: son todos los huevos que se encuentren dentro del nido con indicios de haber sido depredados (con huecos por lo general).• Huevos con hormigas: son los huevos que a la hora de la exhumación se encuentran siendo devorados por hormigas.• Huevos con hongos: son todos los huevos que presentan hongos a la hora de la exhumación.• Sin desarrollo aparente: son los huevos que al abrirlos no presentan indicios de haber iniciado el proceso embrionario.• Con desarrollo aparente: son los huevos que muestran indicios de haber iniciado el proceso embrionario, pero que es apenas el inicio, por ejemplo un pequeño punto como un ojo o una venita de sangre.• Batidos: son todos los huevos que al abrirse no se puede distinguir la yema de la clara pues están mezclados.
--	--

	<ul style="list-style-type: none">• Estadía embrionaria I. corresponde a los embriones que tenga menos del 25% del espacio del huevo ocupado.• Estadía embrionaria II. Menos del 50% del espacio del huevo ocupado.• Estadía embrionaria III. Menos del 75% del espacio del huevo ocupado.• Estadía embrionaria IV. Embrión que ocupa menos o el 100% del espacio del huevo.
Verificadores	Hoja de campo para el recorrido en playa. Gráficas de tendencia de la temporada.
Rango de Variación permisible	La escala a utilizar para el indicador es la siguiente: Muy malo = 0-20% Malo = 21-49% Medio = 50-60% Bueno = 61-74% Muy bueno = 75-100%

Temperatura de incubación para el anidamiento

Objeto de conservación: Playa de anidación de tortuga marina	
Categoría: Composición	
Indicadores a medir: Temperatura de incubación para el anidamiento	
Metodología	<p>Las mediciones de temperatura de incubación se realizaron únicamente en el vivero experimental. Los equipos utilizados serán dispositivos o Datalogger para la toma de temperatura en la arena.</p> <p>Procedimiento de implementación:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Se colocó el termoregistrador amarrado o sujeto a una cinta refractora y esta cinta saliéndose de la arena del vivero.2) Los registradores se colocarán a 25 cm de profundidad en áreas cerca de los nidos que posean huevos.3) Se extrajeron los registradores para descargar los datos y se harán anotaciones de temperatura en una bitácora de registro de forma diaria, cada 24 horas.4) Se desplegará toda la información que se obtuvo durante el día y se evaluará el comportamiento de la temperatura.5) Descargada la información, se reprograma el registrador para poder colocarse en otro sitio e reiniciar el procedimiento de implementación.6) Se elaborará un mapa simulando el vivero, para mostrar los promedios de temperatura registrados.

RESULTADOS

INFORME DE COLECTA CIENTIFICA

Tipos de muestras

Los grupos taxonómicos que fueron objeto de manipulación fueron las hembras adultas *Lepidochelys olivacea*, y los huevos de la misma especie fueron objeto de colecta temporal. Los huevos fueron colectados temporalmente a través de reubicación en un tortugario, donde fueron protegidos hasta el tiempo de eclosión y liberados a su hábitat natural una vez que los neonatos salieron del nido. Las muestras consistieron en los organismos completos. Las medidas que se tomaron para manipular, transportar y liberar, junto con las medidas de sanidad y prevención contra la propagación de patógenos entre individuos, se describe anteriormente en la sección de metodología de este informe.

Cantidades

La cantidad de huevos que fueron colectados fueron 3752 todos trasladados al vivero.

Uso del material colectado

Como las hembras adultas no fueron colectadas, no se realizó colecta del animal ni de ninguna de sus partes anatómicas, ni fluidos corporales. En el caso de los huevos colectados y llevados al vivero, no fueron objeto de análisis en laboratorio u otro análisis científico que requiriera su traslado a un centro de investigación. Estos fueron reubicados en el tortugario mediante la recreación del nido con las mismas características que la tortuga lo hace en playa y fueron protegidos 24 horas al día y por el tiempo que se llevará su eclosión.

Los neonatos eclosionados dentro del vivero, fueron inmediatamente liberados al mar en diferentes sectores de la playa y teniendo en cuenta la distancia debida entre

playa y mar, para que los neonatos pudieran hacer el recorrido que naturalmente hacen una vez que salen del nido.

Los especímenes que no completaron su desarrollo embrionario a término, fueron contabilizados y se describió su estado embrionario, los mismos posteriormente fueron enterrados en un sector de la playa y no se colectó ningún espécimen para su análisis. La cantidad de éstos huevos se detallan más adelante.

INFORME DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Área física disponible como sitio de anidamiento

Para la temporada 2020-2021 en playa Ario, la cantidad de tortugas marinas que llegaron a la playa por mojón (cada 50 metros), fue mínima, dado el poco patrullaje de playa realizado, por lo que no se detallan los mojones en donde fueron avistadas las tortugas.

Número de hembras anidadoras

Para esta temporada se dio un avistamiento de 42 tortugas marinas, las cuales todas anidaron y sus huevos fueron colcoados en el tortugario, lo que corresponde a un 100% de anidación.

Número de nidos por especie

La cantidad de nidos vs anidación se dio en un 100%, es decir que de las 42 tortugas que anidaron se trasladó al tortugario instalado en playa Ario.

Lepidochelys olivacea es la especie más representativa en Buena Vista por su frecuente arribada durante las temporadas monitoreadas.

Porcentaje de eclosión de las nidadas en playa

Para el cuadro 1, se muestran los datos de la cantidad de huevos colocados en el vivero y cuántos de éstos lograron eclosionar de forma exitosa, con un porcentaje promedio de 79% el cual se considera muy bueno.

El promedio de días para que se dé la eclosión del nido ronda entre los 45 y 50 días, por lo que las labores de cuidado del vivero se extendieron hasta el mes de marzo, así como las labores de exhumar el nido y valorar las posibles afectaciones o impedimentos que se dieron para el óptimo desarrollo del embrión, en los siguientes cuadros se muestran dichos parámetros.

Cuadro 1: Éxito de eclosión de las anidadas reubicadas en vivero, temporada 2020-2021.

Mes	Siembra huevos	Total emergencias	E. muertos	% eclosión
Julio	335	291	5	87%
Agosto	570	379	0	66%
Septiembre	95	93	0	98%
Octubre	685	661	2	96%
Noviembre	347	245	0	71%
Diciembre	994	719	0	72%
Total	3026	2388	7	79%

Dada la emergencia por COVID-19, no se pudo realizar un patrullaje oportuno y que permitiera la disminución por saqueo de huevos por parte de personas de la comunidad, por lo que es muy probable que esta problemática haya aumentado.

Cuadro 2: Factores que afectaron el desarrollo del embrión, reubicados en el vivero de tortugas marinas temporada 2018-2019.

Mes	SDA	CDA	Batidos
Junio			
Julio	3		20
Agosto			18
Septiembre			1
Octubre		8	9
Noviembre			22
Diciembre			47
Enero	628		

SDA: Sin desarrollo aparente

CDA: Con desarrollo aparente

Cuadro 3: Estadios embrionarios en el estudio de nidos después de cumplirse los días de incubación, temporada 2018-2019.

Mes	I	II	III	IV
Junio				
Julio	16			
Agosto				
Septiembre				
Octubre	5			
Noviembre	5			
Diciembre	7			
Total	33	0	0	0

De los cuadros anteriores, se puede observar que hubo una afectación en los meses de enero que no permitieron la eclosión de la cantidad de los huevos que

corresponden a los últimos huevos colocados en el tortugario, factores que pueden deberse a factores como temperaturas altas o manejo inadecuado del nido.

Temperatura de incubación para el anidamiento

Para esta temporada las mediciones de temperatura en el tortugario de playa Ario no se pudieron realizar por factores relacionados a la emergencia sanitaria por COVID-19, así como factores climáticos como fue afectación de huracanes como el ETA e IOTA.

Recomendaciones de manejo

Para el manejo y conservación de tortugas marinas en playa Ario se requiere tomar ciertas medidas para que la anidación de las tortugas marinas no se vea tan afectada por actividades de saqueo principalmente.

- **Residuos sólidos:** se continúan con las labores de limpieza de playa durante toda la temporada, ya que los residuos sólidos son un problema persistente en la playa.
- **Oleaje fuerte:** en esta temporada se mantuvo periodos de oleajes fuertes, lo que implica mantener las medidas de barrera en el vivero para evitar una afectación directa sobre éste. El oleaje fuerte acarrea también mucho residuo sólido y troncos. Además, afecta los recorridos de playa de forma eficiente para la detección de los avistamientos de los quelonios.
- **Saqueo de huevos:** el problema de saqueo persiste en la playa y para esta temporada se contó con poco personal voluntario que ayudará a más presencia en playa, para evitar dicho delito,
- **Condiciones climáticas:** presencia de huracanes muy fuertes, que provocaron inundaciones y no permitió el desarrollo de ciertas actividades de manejo.
- **Emergencia sanitaria por COVID-19:** la pandemia, trajo consigo el cierre de fronteras y restricción en el desplazamiento de personas, lo que condujo a

una ausencia muy importante en la colaboración de voluntarios y personal para el manejo y protección de la playa.

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS

Los resultados de esta investigación son comunicados mediante un informe al Programa de Investigación del Área de Conservación Tempisque (ACT) del SINAC.

El investigador principal, comparte los datos a la comunidad científica mediante plataformas electrónicas donde se lleva a cabo investigación de poblaciones de tortugas marinas, tal es el caso de Seaturtle.org.

Se presenta los resultados obtenidos al Centro de Investigación de Recursos Naturales y Sociales (CIRENAS).

CONCLUSIÓN

Para esta segunda temporada de anidación en playa Ario, se puede evidenciar lo que es un sitio importante para la conservación de neonatos y que se contribuye para la preservación de especies amenazadas y en peligro de extinción, según lo establece la Ley N°8325.

Dado el problema de presencia en playa, es posible que se haya presentado un aumento en el saqueo de nidos por parte de humanos, problema que siempre ha existido en playa Ario, dado que es una playa solitaria.

Como se indicó, no se realizó nuevamente el monitoreo de las temperaturas, lo cual no permitió tener datos de temperaturas en el vivero y su posible afectación con los huevos y nacimientos de neonatos. Una tarea que queda pendiente una temporada más.

Se espera que haya una mejoría para esta temporada en la contribución de voluntarios para las labores de manejo y disminuir el impacto que la emergencia sanitaria por COVID-19 provocó esta temporada la investigación de las poblaciones de tortugas que anidan en playa Ario.


BIBLIOGRAFÍA

SINAC. 2016. *Protocolo PRONAMEC: Protocolo para el monitoreo ecológico de las playas de anidación de tortugas marinas*. Proyecto Consolidación de Áreas Marinas Protegidas. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), San José, Costa Rica. 43p.

UICN, 2000. *Técnicas de Investigación y Manejo para la Conservación de las Tortugas Marinas* K. L. Eckert, K. A. Bjorndal, F. A. Abreu-Grobois, M. Donnelly (Editores) UICN/CSE Grupo Especialista en Tortugas Marinas Publicación No. 4, 2000 (Traducción al español)

ANEXOS

ANEXO 1

Fecha:		Estación:	Marea: 1/2↑ ↑ 1/2↓ ↓	Correlativo:	
Líder:			Escribe:		
<u>Horas</u>		<u>Datos de anidación</u>			
Encuentro		Mojón:	Anidó: SI NO N/S	Z Puesta: Veg Borde Abierto	
In Puesta		Eta: 1 2 3 4	Destino: Vivero Reubicado Natural		
Fin Puesta		5 6 7 8	T. Huevos:	Código:	Nº nido:
Siembra		Especie:	Estado del tiempo:		
<u>Actividades Antropogénicas Presentes en la Playa</u>					
Fogatas: SI NO			Presencia de Residuos sólidos: SI NO		
<u>Datos biométricos de la tortuga</u>					
LCC 1:	LCC 2:	LCC 3:	Ancho del rastro:		
ACC 1:	ACC 2:	ACC 3:			
<u>Proceso de Marcaje de las aletas delanteras</u>					
Izquierda	SI NO # _____	Cicatriz	Desgarre	Hueco	No presenta
Derecha	SI NO # _____	Cicatriz	Desgarre	Hueco	No presenta
Responsable del vivero:					
<u>Observaciones</u>					
					

DATOS DE VIVERO				
1º Emergencia		2º Emergencia		3º Emergencia
Responsable:		Responsable:		Responsable:
Fecha:		Fecha:		Fecha:
Hora:		Hora:		Hora:
N.Vivos:		N.Vivos:		N.Vivos:
N.muertos:		N.muertos:		N.muertos:
Estado del tiempo:		Estado del tiempo:		Estado del tiempo:
EXHUMACIÓN				
Responsable:			Fecha:	Hora:
Neonato Emergiendo vivo:	Neonato Emergiendo muerto:	Neonato dentro del nido vivo:	Neonato dentro del nido vivo:	Especie:
				Días de incubación:
Huevos				
Huevos depredados		Huevos con hormigas		Huevos con hongos
Huevos enteros				
Sin desarrollo aparente		Con desarrollo aparente		Batidos
Huevos con embrión				
Estadías embrionarias				
I	II	III	IV	
Observaciones				

ANEXO II Características generales de *Lepidochelys olivacea* (tortuga Lora)

- a) **Características morfológicas:** Posee un caparazón corto y ancho, pero más alto que en las *L. Kempii*; alta proyección ventral en los juveniles, liso, elevado y ligeramente tecniforme (en forma de tienda de campaña), poseen de cinco a nueve pares de escudos costales (comúnmente seis a ocho) frecuentemente con un configuración asimétrica, escudos del caparazón ligeramente traslapados en juveniles y sin traslape en adultos, su cabeza es relativamente grande y triangular presentando un ancho de hasta 13 cm, dos pares de escamas pre-frontales. Las extremidades poseen dos uñas en cada aleta (algunos adultos pueden perder la uña secundaria en las aletas delanteras) poseen una coloración en el dorso de color gris en juveniles y color verde olivo intermedio a oscuro en adultos; ventralmente blanca en juveniles y amarillo crema en adultos. El plastrón con poro pequeño y distintivo cerca de la margen posterior de cada uno de los cuatro escudo inframarginales.
- b) **Dimorfismo sexual:** Las garras de las aletas anteriores más desarrolladas, cola un poco más gruesa y cornificada en los machos.
- c) **Distribución:** Aguas tropicales del pacífico, Indico y Atlántico del Sur.
- d) **Comportamiento:** Les gusta especialmente flotar sobre el agua, para calentarse, de hecho la forma de su caparazón les facilita la absorción de los rayos solares, pueden bucear por 30 min, y alcanzar profundidades de hasta 200 m.
- e) **Reproducción:** El cortejo y la cópula ocurren en el agua marina a poca distancia de la playa de anidamiento, generalmente a no más de 1 Km de distancia. Presentan tanto anidación masiva como solitaria; en el caso de la anidación masiva, varios miles de individuos se congregan frente a playas relativamente cortas y reutilizadas, y en un momento determinado responden en conjunto ante indicadores aún desconocidos para emerger masivamente, haciendo uso de todo el espacio físico que esa playa ofrezca durante varias noches; esto deja como resultado muchos cientos de nidos y huevos desenterrados por aquellas hembras que anidaron en la segunda mitad de

las 4 ó 5 noches de anidamiento, depositan de 40 a 130 huevos por nido y la incubación toma de 50 a 60 días.

- f) **Dieta:** es una tortuga marina principalmente carnívora. Ella se abastece de medusas, caracoles, camarones, cangrejos y pescados. A veces se encuentran algunos individuos muertos sobre las playas con oclusiones intestinales debido a las bolsas plásticas que se encuentran en el mar y que se asemejan al movimiento de las medusas.

